

**TABEAU B : DESCRIPTIF DES MODES OPERATOIRES ASSOCIES AUX NIVEAUX DU PLAN**

|   | niveau 1   | niveau 2  | niveau 3  | niveau 4  | niveau 5  |
|---|--|---|---|---|---|
| odés opératoires                                  |  |   |   |   |   |
| périmètre   | 150m en intégrant les données historiques et les retours du terrain                        | 150m en intégrant les données historiques et les retours du terrain   | fusion des périmètres des cas du foyer adaptée à la morphologie urbaine   | fusion des périmètres adaptée à la morphologie urbaine  |   |
| cartographie et rétro information                 | rapport systématique et individuel   | rapport systématique et individuel  | selon rythme et nombre de signalements: rapport systématique et individuel - bilan des actions par foyers           | rapport des actions par foyers  |   |
| prospection entomologique et lutte anti larvaire  | oui si absence de connaissances préalables (piège pondoir positif, enquête antérieure...)  | oui, idem   | Oui, idem   | Oui, idem   |   |
| recherche des contraintes de traitement aduifcide | oui pour informer les propriétaires afin d'appliquer des mesures de prévention             | oui pour informer les propriétaires afin d'appliquer des mesures de prévention  | oui pour informer les propriétaires afin d'appliquer des mesures de prévention                                      | oui pour informer les propriétaires afin d'appliquer des mesures de prévention                                    |   |
| campagne d'information                            | oui pour la prévention des gîtes et des piqûres  | oui pour la prévention des gîtes et des piqûres   | oui pour la prévention des gîtes et des piqûres. Mobilisation de relais dans les quartiers touchés                  | oui pour la prévention des gîtes et des piqûres. Mobilisation de relais dans les quartiers touchés                | dans les foyers : non applicable car arrêt de la gestion individuelle des cas - procédure maintenue autour des cas isolés |
| traitement péridomiciliaire                       | Oui dans périmètre rapproché (~50m autour du cas, selon la configuration du terrain)       | Oui dans périmètre rapproché (~50m autour du cas)   | oui selon rythme des signalements et taille du foyer - uniquement dans périmètre rapproché (~50m autour du cas)     | oui selon rythme des signalements et taille des foyers - uniquement dans périmètre rapproché (~50m autour du cas) |   |
| recherche des absents                             | Oui, à proximité immédiate du cas si nécessité absolue pour l'efficacité du traitement     | Oui, sur 2-3 jours, autour du cas initial sur un pourcentage de la surface considérée. Un passage en journée, un le soir. | Oui, sur 2-3 jours  | Oui, sur 2-3 jours  |   |
| traitement spatial du périmètre                   | 1 pulvérisation  | 2 pulvérisations à 3-4 jours d'intervalle autour des cas autochtones  | 2 pulvérisations espacées de 3-4 jours dans chaque foyer - poursuite des actions tant qu'il y a des cas autochtones | 2 pulvérisations espacées de 3-4 jours dans chaque foyer - poursuite des actions tant qu'il y a des cas           |   |
| l'aduifcide                                       | selon contraintes environnementales et efficacité de l'alternative (ex : pyrèthre naturel) | Deltaméthrine   | Deltaméthrine   | Deltaméthrine   |   |