

Chronologie Vaccinale	Primovaccination				Rappels			
Scénarii	Infection Prouvée	1ère dose	Infection Prouvée	2ème dose	Infection Prouvée	1 ^{er} Rappel	Infection Prouvée	2 ^{ème} Rappel
Schéma standard		PFIZER > 18 ans MODERNA > 30 ans		> 3 semaines si PFIZER > 4 semaines si MODERNA		> 3 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA 1/2 dose > 30 ans	OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
Infection avant la 1ère dose	OUI	> 2 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA > 30 ans				> 3 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA 1/2 dose > 30 ans	OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
Infection < 15 jours après la 1ère dose		PFIZER > 18 ans MODERNA > 30 ans	OUI <15 jours après la 1ère dose	> 2 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA > 30 ans		> 3 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA 1/2 dose > 30 ans	OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
Infection > 15 jours après la 1ère dose		PFIZER > 18 ans MODERNA > 30 ans	OUI > 15 jours après la 1ère dose			> 3 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA 1/2 dose > 30 ans	OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
Infection < 3 mois après la 2ème dose		PFIZER > 18 ans MODERNA > 30 ans		> 3 semaines si PFIZER > 4 semaines si MODERNA	OUI < 3 mois après la 2ème dose	> 3 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA 1/2 dose > 30 ans	OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
Infection > 3 mois après la 2ème dose		PFIZER > 18 ans MODERNA > 30 ans		> 3 semaines si PFIZER > 4 semaines si MODERNA	OUI > 3 mois après la 2ème dose		OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
Infection avant et après la 1ère dose	OUI	> 2 mois après: - PFIZER > 18 ans - MODERNA > 30 ans			OUI > 3 mois après la 2ème dose		OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*
2 infections après la 1ère dose		PFIZER > 18 ans MODERNA > 30 ans	OUI > 15 jours après la 1ère dose		OUI et > 3 mois		OUI	> 3 mois après le dernier rappel OU l'infection dès 80 ans/EHPAD/USLD > 6 mois après le dernier rappel (<u>ET</u> > 3 mois après une infection) pour les moins de 80 ans éligibles*

Protocole de vaccination avec un vaccin ARNm

Un schéma complet comprend 3 stimulations du système immunitaire (vaccination et/ou infection) à condition que :

- Le délai minimal entre 2 stimulations soit respecté
- 3 stimulations dont une dose de vaccination pour la primovaccination

Lecture du tableau:

- De gauche à droite par scenario

-  = Vaccination  = Infection prouvée

- Un schéma vaccinal complet doit comporter au minimum 3 couleurs ( et/ou ) , 4 ou 5 couleurs pour la population

éligible au 2ème rappel* (Rappel recommandé qu'il y ait eu ou non infection avant le 2ème rappel )

***Population éligible aux 2ème rappel:**

- Pour tous dès 60 ans
- aux adultes âgés de 18 à 60 ans identifiés comme étant à risque de forme grave de Covid-19**
- aux femmes enceintes, dès le 1er trimestre de grossesse
- aux personnes vivant dans l'entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables ou immunodéprimées, dans une stratégie de cocooning.
- à tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé;
- à l'ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire, ainsi qu'aux pompiers, quel que soit leur âge, leur mode d'exercice et leur état de santé

Personne à risqué de forme grave:**

- Très haut risque de forme grave:

Chimiothérapie

Insuffisance rénale sévère

Transplantation d'organes solides

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Polypathologie chronique avec au moins 2 insuffisances d'organes

Trisomie 21

Mucoviscidose

Autres maladies rares sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf

- Copathologies avec facteur de risque de forme grave:

Pathologies cardio-vasculaires (HTA compliquée, AVC, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque, coronaropathie)

Diabète de types 1 et 2

Pathologies respiratoires chroniques (BPCO, insuffisance respiratoire, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil)

Insuffisance rénale chronique

Obésité avec IMC ≥ 30

Cancer ou hémopathie maligne

Maladies hépatiques chroniques (cirrhose)

Immunodépression congénitale ou acquise

Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie

Pathologies neurologiques (maladies du motoneurone, myasthénie grave, SEP, Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégié, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive)

Troubles psychiatriques

Démence